

# 按時服藥

## 按時服用JYNARQUE® (托伐普坦)

在您首次醒來時服用JYNARQUE。第二劑JYNARQUE應在服用第一劑8小時後服用，這很重要。第一劑JYNARQUE劑量應該高一些，第二劑劑量低一些。按這種分次劑量服用JYNARQUE可確保它在您體內達到最佳平衡，以免您醒來小便。完全遵照醫囑服用JYNARQUE。

務必飲用足夠的水，以免口渴或脫水。如果您錯過一劑JYNARQUE的服藥時間，應按正常時間服用下一劑。

**JYNARQUE經證實可延緩有自體染色體顯性多囊性腎臟病(ADPKD)迅速惡化風險的成年人的腎功能衰竭。**

## 重要安全資訊：

**嚴重肝臟問題。**JYNARQUE可能引起嚴重肝臟問題，導致需要肝臟移植或導致死亡。如果您有以下任何症狀，應立即停止服用JYNARQUE，並打電話給您的醫療服務提供者：感覺疲倦、發熱、食慾不振、皮疹、噁心、瘙癢、胃（腹部）右上部疼痛或觸痛、皮膚和眼白變黃（黃疸）、嘔吐、尿色深。

這張圖可幫助您記住什麼時候服用第二劑。

較高劑量的錠劑 (醒時服用)	較低劑量的錠劑 (8小時後服用)
早晨5時	下午1時
早晨6時	下午2時
早晨7時	下午3時
上午8時	下午4時
上午9時	下午5時
上午10時	下午6時
上午11時	下午7時
下午12時 (中午)	晚上8時
下午1時	晚上9時
下午2時	晚上10時
下午3時	晚上11時
下午4時	凌晨12時 (午夜)
下午5時	凌晨1時
下午6時	凌晨2時
下午7時	凌晨3時
晚上8時	凌晨4時
晚上9時	早晨5時
晚上10時	早晨6時
晚上11時	早晨7時
凌晨12時 (午夜)	早晨8時
凌晨1時	上午9時
凌晨2時	上午10時
凌晨3時	上午11時
凌晨4時	下午12時 (中午)

請閱讀「[重要安全資訊](#)」。

# JYNARQUE® (托伐普坦) 的適應症和重要安全資訊

## 適應症：

### 什麼是JYNARQUE？

JYNARQUE是一種處方藥，用於延緩有自體染色體顯性多囊性腎臟病(ADPKD)迅速惡化風險的成年人的腎功能衰竭。JYNARQUE對兒童是否安全和有效尚不明確。

## 重要安全資訊：

• **嚴重肝臟問題。**JYNARQUE可能引起嚴重肝臟問題，導致需要肝臟移植或導致死亡。如果您有以下任何症狀，應立即停止服用JYNARQUE，並打電話給您的醫療服務提供者：

- 感覺疲倦
- 食慾不振
- 噁心
- 胃（腹部）右上部疼痛或觸痛
- 嘔吐
- 發熱
- 皮疹
- 瘙癢
- 皮膚和眼白變黃（黃疸）
- 尿色深

您在開始服用JYNARQUE之前應接受血液檢查，以協助降低肝臟問題的風險。您的醫療服務提供者將在以下時間做血液檢查，檢查您的肝臟：

- 在您開始服用JYNARQUE之前
- 在您開始JYNARQUE治療後2週和4週
- 然後在JYNARQUE治療期間的18個月內每月一次
- 以及此後每3個月一次

因為存在導致嚴重肝臟問題的風險，JYNARQUE只透過一項名為「JYNARQUE風險評估和緩和策略」(REMS)計劃的受限給藥計劃提供。

如果您有以下情形，請勿服用JYNARQUE：

- 有肝臟問題病史或有肝臟問題的病徵或症狀，不包括多囊性肝病
- 無法感覺您是否口渴或無法透過喝水補充水份
- 曾被告知您血液中的鈉（鹽）含量過高或過低
- 脫水
- 對托伐普坦或JYNARQUE的任何成份過敏
- 無法小便

請將您的所有醫療狀況告訴您的醫療服務提供者，包括您是否有以下情形：

- 有鈉（鹽）含量過低的病史
- 已經懷孕或打算懷孕。托伐普坦是否會損害您未出生的胎兒尚不明確。如果您已懷孕或認為您可能懷孕，請告訴您的醫療服務提供者
- 正在母乳哺育或打算母乳哺育。托伐普坦是否會進入您的乳液尚不明確。在JYNARQUE治療期間請勿母乳哺育。請向您的醫療服務提供者請教在此期間哺育嬰兒的最佳方式

將您服用的所有藥物告訴您的醫療服務提供者，包括處方藥、非處方藥、維生素和草藥補充劑。

- JYNARQUE與某些藥物同時服用可能導致您血液中的托伐普坦過多。JYNARQUE不得與某些藥物同時服用。您的醫療服務提供者可告訴您JYNARQUE與其他藥物同時服用是否安全
- 不要在未告知您的醫療服務提供者情形下開始服用新藥

JYNARQUE可能導致嚴重的副作用，包括：

• **您血液中的鈉過多（高鈉血症）和體液流失過多（脫水）。**在有些情形下，脫水可能引起體液極度流失，稱為低血容量症。您口渴時應該喝水，白天和夜裡都應該喝。如果您因為任何原因無法喝到足夠的水，例如無法獲得水，或者嘔吐或腹瀉，應停止服用JYNARQUE，並打電話給您的醫療服務提供者。如果您有以下任何症狀，應告訴您的醫療服務提供者：

- 暈眩
- 昏厥
- 體重減輕
- 心搏變化
- 感覺混亂或虛弱

服用JYNARQUE期間您應避免什麼？

在JYNARQUE治療期間不要飲用葡萄柚汁。這可能導致您血液中的托伐普坦過多。

JYNARQUE最常見的副作用是：

- 口渴和液體攝入量增加
- 尿量增多、尿頻和夜尿

這並不包括JYNARQUE可能產生的所有副作用。請將困擾您或持續不退的任何副作用告訴您的醫療服務提供者。如果需要更多的資訊，請詢問您的醫療服務提供者或藥劑師。

如果您對自己的健康或藥物有任何問題，請與您的醫療保健專家討論。

如果要報告疑似不良反應，請撥1-800-438-9927聯絡Otsuka America Pharmaceutical, Inc.，或撥1-800-FDA-1088聯絡食品及藥物管理局(FDA) ([www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch))。

請閱讀**完整的處方資訊**，包括隨附的**加框警語**和**用藥須知**。



Otsuka  
Otsuka America Pharmaceutical, Inc

© 2018年Otsuka America Pharmaceutical, Inc.版權所有。

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.製造，日本東京101-8535。  
Otsuka America Pharmaceutical, Inc.分銷和行銷，Rockville, MD 20850。  
JYNARQUE是Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.的商標，日本東京101-8535。

2018年8月 10US18EBC0116