



非真实患者。

延缓您ADPKD 进展的

风险因素检查表和提示

对于存在病情快速进展风险的ADPKD成人患者，JYNARQUE®（托伐普坦）是唯一一种经FDA批准的能够在数年内减缓肾功能衰退的治疗方法。

使用本文件列出的检查表，
看看JYNARQUE是否适合您

ADPKD=常染色体显性多囊肾病。

适应症和重要安全信息摘选：

JYNARQUE是什么？

JYNARQUE是一种处方药，用于存在病情快速进展风险的常染色体显性多囊肾病 (ADPKD) 成人患者，延缓肾功能的下降。JYNARQUE对于儿童是否安全和有效尚不明确。

严重的肝脏问题。 JYNARQUE可能引起严重肝脏问题，导致需要肝脏移植或导致死亡。如果您出现以下任何症状，应立即停止服用JYNARQUE，并致电您的医护人员：感觉疲劳、食欲不振、恶心、胃（腹部）右上方疼痛或压痛、呕吐、发热、皮疹、发痒、皮肤和眼白变黄（黄疸）、尿色加深。

请阅读包括**加框警告**在内的
完整处方信息以及**用药指南**。

 **JYNARQUE®**
(tolvaptan)
15, 30, 45, 60, 90 mg tablets

ADPKD风险因素检查表

如果您患有ADPKD并且超过18岁，请勾选所有适用选项，看看您是否有快速进展的风险：



我的肾功能快速下降（通过较高的肌酐水平或较低的eGFR来衡量）



我的肾脏总体积大（相对于ADPKD患者的年龄，肾脏大于应有的尺寸）



我有某些类型的基因突变*



我有患有ADPKD的家庭成员，其在58岁之前有肾衰竭的病史，例如需要透析或进行肾脏移植



我在35岁之前开始出现高血压



我在35岁之前出现过尿中带血（血尿）、囊肿感染，或与囊肿有关的侧腹部疼痛



我体重超标，体重指数 ≥ 25 千克/平方米



我的尿中含有蛋白质和白蛋白（蛋白尿和白蛋白尿）

如果您勾选了上述一个或多个选项，您可能ADPKD快速进展的风险，您可能适合服用JYNARQUE®（托伐普坦）进行治疗。

利用上述检查表中的答案和您的肾脏科医生进行交流，确定下一步的最佳措施，帮助您控制ADPKD。

重要安全信息摘要

您在开始服用JYNARQUE之前应接受血液检查，以协助降低肝脏问题的风险，这很重要。您的医护人员将在以下时间做血液检查，检查您的肝脏：

- 在您开始服用JYNARQUE之前
- 在您开始JYNARQUE治疗后2周和4周
- 然后在JYNARQUE治疗期间的18个月内每月一次
- 以及此后每3个月一次

请参阅第4-5页的
重要安全信息。

 **JYNARQUE®**
(tolvaptan)
15, 30, 45, 60, 90 mg tablets



与您的肾脏科医生合作的提示

如果您已确认适合使用JYNARQUE进行治疗，务必与您的肾脏科医生建立良好的关系，并进行深入的交谈，探讨您的治疗方案和您对控制ADPKD的期望。



向您的肾脏科医生咨询正确用药方法



确保您的医疗保健团队（包括医护人员和药剂师）了解您正在服用的所有药物

了解您的疾病进展

肾脏大小是ADPKD是否有快速进展风险的一项重要指标。与肾脏科医生合作，详细了解您的肾脏状况以及疾病进展速度。其中可能包括肾脏科医生使用MRI或CT扫描了解肾脏状况的细节。

CT=计算机断层扫描；eGFR=估算肾小球滤过率；MRI=磁共振成像。

*某些类型的基因突变与ADPKD快速进展的风险相关。咨询您的医生，了解更多信息。

请参阅第4-5页的
重要安全信息。

 **JYNARQUE[®]**
(tolvaptan)
15, 30, 45, 60, 90 mg tablets

JYNARQUE® (托伐普坦) 的适应症和重要安全信息

适应症:

JYNARQUE是什么?

JYNARQUE是一种处方药,用于存在病情快速进展风险的常染色体显性多囊肾病(ADPKD)成人患者,延缓肾功能的下降。JYNARQUE对于儿童是否安全和有效尚不明确。

重要安全信息:

• **严重的肝脏问题。** JYNARQUE可能引起严重肝脏问题,导致需要肝脏移植或导致死亡。如果您有以下任何症状,应立即停止服用JYNARQUE,并致电您的医护人员:

- 感觉疲倦
- 食欲不振
- 恶心
- 胃(腹部)右上方疼痛或压痛
- 呕吐
- 发热
- 皮疹
- 发痒
- 皮肤和眼白变黄(黄疸)
- 尿色加深

您在开始服用JYNARQUE之前应接受血液检查,以协助降低肝脏问题的风险,这很重要。您的医护人员将在以下时间做血液检查,检查您的肝脏:

- 在您开始服用JYNARQUE之前
- 在您开始JYNARQUE治疗后2周和4周
- 然后在JYNARQUE治疗期间的18个月内每月一次
- 以及此后每3个月一次

因为存在导致严重肝脏问题的风险,所以JYNARQUE只能通过一项名为“JYNARQUE风险评估和缓解策略(REMS)”计划的受限给药计划提供。

如果您有以下情形,请勿服用JYNARQUE:

- 有肝脏问题病史或有肝脏问题的体征或症状,不包括多囊性肝病
- 无法感觉您是否口渴或无法通过喝水补充水分
- 曾被告知您血液中的钠(盐)含量过高或过低
- 脱水
- 对托伐普坦或JYNARQUE的任何成分过敏
- 无法排尿

请阅读包括**加框警告**在内的**完整处方信息**以及**用药指南**。

JYNARQUE® (托伐普坦) 的适应症和重要安全信息 (续)

告诉医护人员您的所有医疗状况, 包括您是否有以下情形:

- 有钠 (盐) 含量过低的病史
- 已怀孕, 或计划怀孕。目前尚不清楚托伐普坦是否对胎儿有害。如果您已怀孕或认为您可能怀孕, 请告诉您的医护人员
- 正在哺乳或打算哺乳。目前尚不清楚托伐普坦是否会进入乳汁。在接受 JYNARQUE 治疗期间请勿哺乳。请咨询医护人员了解在此期间的最佳婴儿喂养方式

请将您所有的用药都告知医护人员, 包括处方药和非处方药、维生素和草药补品。

- JYNARQUE 与某些药物同时服用可能导致您的血液中托伐普坦过多。JYNARQUE 不得与某些药物同时服用。您的医护人员可告诉您 JYNARQUE 与其他药物同时服用是否安全
- 在未事先咨询医护人员的情况下, 请勿开始使用任何新药

JYNARQUE 可能导致严重的副作用, 包括:

- **您血液中钠过多 (高钠血症) 和体液流失过多 (脱水)。** 在有些情况下, 脱水可能引起体液极度流失, 称为低血容量症。您口渴时应当喝水, 白天和夜里都应当喝。如果您因为任何原因无法喝到足够的水, 例如无法获得水, 或者呕吐或腹泻, 则应停止服用 JYNARQUE, 并致电医护人员。如果您有以下任何症状, 请告诉您的医护人员:
 - 眩晕
 - 心悸变化
 - 昏厥
 - 感觉混乱或虚弱
 - 体重减轻

在服用 JYNARQUE 期间您应避免做什么?

在接受 JYNARQUE 治疗期间请勿喝葡萄柚汁, 否则会导致您血液中存留的托伐普坦过多。

JYNARQUE 最常见的副作用包括:

- 口渴和液体摄入量增加
- 尿量增多、尿频和夜尿

这些并不是 JYNARQUE 的所有潜在副作用。请将任何令您困扰或持续出现的副作用告知您的医护人员。如需了解更多信息, 请咨询您的医护人员或药剂师。

如果您对自己的健康或药物有任何问题, 请咨询您的专业保健医生。

如果要报告疑似不良反应, 请致电 1-800-438-9927 联系大家制药美国有限公司, 或者拨打 1-800-FDA-1088 或者登录网址 www.fda.gov/medwatch 与 (美国) 食品药品监督管理局 (FDA) 取得联系。

请阅读包括 **加框警告** 在内的 **完整处方信息** 以及 **用药指南**。



对ADPKD的快速进展和**JYNARQUE®** (托伐普坦) 仍有**疑问?**

大家的**JYNARQUE**社区随时提供帮助



扫描这里

与**朋辈辅导员**联系

和朋辈辅导员交谈，听听他们对自己的ADPKD快速进展以及服用**JYNARQUE**的体验；致电**1-855-415-7459**或**扫描左边的二维码**。

与**大家患者支持中心**进行交流

我们的团队可以回答有关药物、患者就医方面的一般性问题，并能提供援助引导您的治疗过程；致电**1-855-242-7787**并选择选项3来和我们的工作人员交谈。

请阅读包括**加框警告**在内的**完整处方信息**以及**用药指南**。

点赞并关注**JYNARQUE**



fb.com/JYNARQUE



@jynarque_tolvaptan



@JYNARQUE

